



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มอารักขาพืช โทร.๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘

ที่ ตร ๐๐๐๙/ว ๓๖๕๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดศัตรูพืช
(มะพร้าว มัณสาปะหลัง ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน)

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดแนวทางดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดศัตรูพืช (มะพร้าว มัณสาปะหลัง ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน) โดยแจ้งให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดศัตรูมะพร้าว

๑.๑ การสร้างการรับรู้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
แนวทางการควบคุม ป้องกัน กำจัด ศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน (IPM)

๑.๒ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

๑.๒.๑ สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ระดับศัตรูมะพร้าวในระบบ
รายงาน <https://report-ppsf.doae.go.th> อย่างต่อเนื่อง

๑.๒.๒ ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนการระบาด เพื่อการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

๑.๒.๓ หากการระบาดเข้าสู่ภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อระดับเศรษฐกิจ ให้พิจารณารายงาน
กขอ./กขจ. เพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ การป้องกันและควบคุมการระบาด

๑.๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน (IPM) พิจารณาระดับ
ความรุนแรงของการเข้าทำลาย

๑.๓.๒ เน้นการป้องกันกำจัดเชิงรุก โดยลงมือปฏิบัติ "ตัดทางใบทำลาย ฉีดเข้าต้น พ่นใบ
ผลิตใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ" ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม จากการประเมินระดับความรุนแรง

๑.๓.๓ หากเกิดการระบาดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนการดำเนินงาน
ในการป้องกันกำจัด

๑.๔ การให้ความช่วยเหลือ

๑.๔.๑ สนับสนุนชีวภัณฑ์เพื่อใช้ควบคุมการระบาด

๑.๔.๒ พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ให้เข้มแข็ง และสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

๑.๔.๓ บูรณาการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

๑.๕ การติดตามประเมินผล

๑.๕.๑ ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง

๑.๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าการผลิตขยายและปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติของ ศจช.

๑.๕.๓ ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการ สอบทานข้อมูลการระบาดและสร้าง
ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่อง ศัตรูมะพร้าว และการยอมรับการผลิตขยายและใช้ศัตรูธรรมชาติ
และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

๒. มาตรการ...

๒. มาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง

๒.๑ การสร้างการรับรู้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน กำจัด และผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง

๒.๒ การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด

๒.๒.๑ สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ระบาดศัตรูมันสำปะหลัง ในระบบรายงาน <https://report-ppsf.doae.go.th> อย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๒ ส่งเสริมและแรงจูงใจให้เกษตรกรใช้พันธุ์หนานทนต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยะเวลา ๗๒ เกษตรศาสตร์ ๕๐ และห้วยบง ๖๐

๒.๓ การควบคุมการระบาด

๒.๓.๑ พื้นที่เริ่มพบการระบาดหรือพบการระบาดไม่มากสามารถถอนทำลายต้นได้ ขอความร่วมมือเกษตรกรทำลายต้นเป็นโรคและแมลงห้ำหิ้วพาหะนำโรคตามหลักวิชาการ เพื่อลดอัตราการเกิดโรค ลดอัตราการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายของผลผลิต

๒.๓.๒ พื้นที่พบการระบาดรุนแรงต่อเนื่อง แนะนำเกษตรกรพักแปลง เปลี่ยนพืชปลูก ที่มีความเหมาะสมในพื้นที่

๒.๓.๓ ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการพิจารณาดำเนินการออกประกาศ คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง

๓. มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันกำจัดศัตรูทุเรียน

๓.๑ การสร้างการรับรู้

๓.๑.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สื่อความรู้ข้อมูลทางวิชาการ วารสาร การแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ถึงผลกระทบต่าง ๆ แก่สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ

๓.๑.๒ ดำเนินการสอบถามความเข้าใจ ประเมินระดับความรู้และการจัดการปัญหา ศัตรูพืชของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร (รายเดี่ยว) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้

๑) สอบถามความเข้าใจเกษตรกร ได้แก่ การสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาด การเฝ้าระวัง การป้องกันการระบาด รวมถึงการจัดการศัตรูทุเรียน เมื่อพบการระบาดในแปลงปลูก

๒) ประเมินระดับความรู้ของเกษตรกร รวมถึงการจัดการหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และโรครากเน่าและโคนเน่า เช่น การประเมินความสามารถในการระบุชนิดของศัตรูพืชที่พบในสวนทุเรียน รู้จักวงจรชีวิตและพฤติกรรมของศัตรูทุเรียน ความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูทุเรียน ความสามารถในการตรวจสอบและสำรวจศัตรูทุเรียนในสวนอย่างสม่ำเสมอ ความสามารถในการประเมิน สถานการณ์

๓.๒ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

๓.๒.๑ จัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูทุเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ ที่มีประวัติพบการระบาด

๓.๒.๒ สํารวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์ รายงานผลผ่านระบบ รายงานสถานการณ์ระบาดของศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจหลัก ([https://report-ppsf.doae.go.th /site/module](https://report-ppsf.doae.go.th/site/module)) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๓.๒.๓ ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่และวิเคราะห์แนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่อง

๓.๒.๔ แจ้งเตือนสถานการณ์ศัตรูพืชให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ

๓.๓ การป้องกันและควบคุมการระบาด โดยกรณีในพื้นที่ที่ไม่เคยการระบาดของศัตรูพืช แนะนำเกษตรกรให้สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจัดการแปลงโดยวิธีผสมผสาน (IPM) เน้นการจัดการต้นทุเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ ในพื้นที่พบการระบาด ให้จัดการต้นหรือพื้นที่ที่เป็นโรคหรือแหล่งแพร่ระบาดก่อนจึงดำเนินการจัดการแปลงโดยวิธีผสมผสาน (IPM) และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

๓.๔ การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการ ทุเรียน หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการจัดการศัตรูทุเรียนที่เหมาะสมในสภาพแปลงและ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น การวิจัยในงานประจำ (R๒R) เป็นต้น

๓.๕ การติดตามประเมินผล โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับการบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูทุเรียนและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ

๔. มาตรการจัดการโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน จากเชื้อรา *Ganoderma* spp.

๔.๑ การสร้างการรับรู้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ แนวทางการควบคุม ป้องกัน กำจัด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

๔.๒ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาด

๔.๒.๑ สํารวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ระบาดของศัตรูปาล์มน้ำมันในระบบ รายงาน <https://report-ppsf.doae.go.th> อย่างต่อเนื่อง

๔.๒.๒ ติดตามสถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันและ การควบคุมโรคแก่เกษตรกร

๔.๓ การป้องกันและเสริมสร้างความต้านทานโรค

๔.๓.๑ ในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันที่มีปาล์มน้ำมันยืนต้นอยู่ ต้องสำรวจแปลง อย่างสม่ำเสมอ จัดการแปลงปลูกให้สะอาดด้วยการกำจัดเศษซากและตอเก่าต้นปาล์มน้ำมัน จัดการระบายน้ำ ในแปลงไม่ให้ท่วมขัง ปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จัดการธาตุอาหารในดินให้เหมาะสม ส่งเสริม การป้องกันโรคในดินด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทุก ๓ - ๖ เดือน

๔.๓.๒ ในแปลงที่จะปลูกใหม่ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกซ้ำในแปลงที่เคยพบโรค หรือควรพัก การปลูกพืชตระกูลปาล์มอย่างน้อย ๒ ปี ก่อนปลูกควรรองกันหลุมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาและใช้การจัดการ เช่นเดียวกับข้อ ๔.๓.๑

๔.๔ การควบคุม...

๔.๔ การควบคุมการระบาดโดยการชะลอหรือยับยั้งความรุนแรงของโรค โดยการติดตาม ประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง กำจัดดอกเห็ด Ganoderma ออกจากแปลงอย่างถูกวิธี รักษาต้นที่เป็นโรค ด้วยการถากเนื้อไม้บริเวณที่มีอาการเน่า เปื่อยยุ่ยออก ทาหับด้วยสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคในแปลงด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านรอบโคนต้นหรือใช้สารเคมี ตามคำแนะนำราดโคนต้น กำจัดต้นที่แสดงอาการรุนแรง หรือต้นที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการเผาทำลาย หรืออาจขุดล้อมต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกหากทำได้

๔.๕ การติดตามประเมินผลการจัดการ ด้วยการลงสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาดและพื้นที่เสี่ยง และประเมินการยอมรับเทคโนโลยีและคำแนะนำการจัดการโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันของเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการฯ เกิดประโยชน์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการตามมาตรการฯ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดศัตรูพืช (มะพร้าว มันสำปะหลัง ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน) ในแต่ละชนิดพืชที่มีในพื้นที่ โดยรายงานข้อมูลที่ดำเนินการในแต่ละเดือน (ไม่ใช่ข้อมูลสะสม) ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ และสื่อประชาสัมพันธ์ตามมาตรการฯ ๔ ชนิด ทาง QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายวินัย ชัยนิง)
เกษตรจังหวัดตราด



สื่อประชาสัมพันธ์ตาม
มาตรการฯ ๔ ชนิดพืช



แบบฟอร์มรายงานผล