



ที่ ตร ๐๐๐๙/ว ๑๒๔๓

ถึง สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้จัดทำข่าวพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔ เรื่อง คือ ไรแดงแอฟริกัน ราสีชมพู โรคเน่าคอดินในพริก และแมลงดำหนาม เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ให้เกษตรกรทราบและเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ต่อไป



กลุ่มอารักขาพืช

โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๐๘

โทรสาร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๓๘๕

E-mail : trat@doae.go.th

สภาพร โทร. ๐๘๘๒๒๕๑๖๓๖



สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

แมลงดำหนาม

เดือน

พฤศจิกายน

2568

ลักษณะการทำลาย

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดอ่อนที่สุดของมะพร้าวที่ยังไม่คลี่โดยซ่อนตัวในใบอ่อนที่พับอยู่ และจะย้ายไปกินอีกใบอ่อนอีกใบหลังจากที่ใบเดิมคลี่ออก ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโตเมื่อมีการทำลายรุนแรงหลายๆ ใบในแต่ละต้นจะมองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ซึ่งชาวสวนมะพร้าว เรียกว่า “โรคหัวหงอก”



พืชอาหาร

พืชตระกูลปาล์ม เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ปาล์มประดับ หมากเขียว หมากเหลือง และหมากแดง เป็นต้น

ศัตรูธรรมชาติ

แมลงหางหนีบ แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว (*Asecodes hipinarum*) และเชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม

การป้องกันกำจัด

- 1.ใช้วิธีกล ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย
- 2.ใช้ชีววิธี โดยใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แมลงหางหนีบ แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว และเชื้อเมตตาไรเซียม
- 3.ใช้สารเคมีใช้สารเคมีที่มีอันตรายน้อยและสลายตัวเร็ว เช่น คาร์บาริล (เซฟวิน 85% wp) อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในแปลงเพาะกล้าพืชตระกูลปาล์ม ก่อนการเคลื่อนย้ายจากแหล่งที่มีการระบาดทุกครั้ง
- 4.การกักกันการเคลื่อนย้ายต้นกล้าและพืชอาศัยตระกูลปาล์มจากพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว



039-512322



สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองตราด



ที่มา : สำนักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร



ไรแดง

ลักษณะการทำลาย

ไรแดงทุเรียน ดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่บริเวณผิวใบทุเรียน ทำให้เกิดเป็นจุดปะสีขาวกระจายอยู่ทั่วบนใบ ต่อมาจุดปะสีขาวจะแผ่ขยายออกไปเป็นบริเวณกว้าง จนใบมีอาการขาวซีดและมีคราบสีขาวเกาะติดเป็นรอยขาวๆคล้ายฝุ่นจับ ถ้าหากมีไรแดงทำลายเป็นปริมาณมากและต่อเนื่องจะทำให้ใบร่วงและมีผลกระทบต่อการออกดอกและติดผลของทุเรียน ต้นทุเรียนจะเกิดความเสียหายจากไรแดงเมื่อใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 25 ของใบที่สำรวจ



การแพร่ระบาด

พบระบาดในแหล่งปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี แพร่ และ อุตรดิตถ์ ระบาดในระยะที่ฝนเริ่มทิ้งช่วง อากาศแห้งแล้งและมีลมพัดแรง จะพบไรแดงสูงที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม จากนั้นไรแดงจะค่อยๆลดลง ปริมาณอาจสูงขึ้นอีกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งแล้งจัด

การป้องกันกำจัด

1. หมั่นตรวจดูใบทุเรียน โดยใช้แว่นขยาย กำลังขยาย 10 เท่า ส่องดูด้านหน้าใบ ในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีลมพัดแรง และฝนทิ้งช่วง
2. สารฆ่าไรที่ใช้ได้ผลในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน ได้แก่ สารโพรพาร์ไธต์ 30% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทั้งต้นโดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรระบาด การใช้สารฆ่าไรไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรใช้สลับชนิดกัน เพื่อป้องกันไรสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าไร และใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น





สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

ประจำเดือน

ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

พฤษภาคม

ราสีชมพู

ลักษณะการทำลาย

ต้นทุเรียนที่เป็นโรคจะมีอาการใบเหลืองและร่วงหล่น มองดูคล้ายกับอาการที่เกิดจากโรครากเน่าโคนเน่า กิ่งทุเรียนที่ถูกทำลายจะพบเส้นใยของเชื้อราลักษณะสีขาวเจริญปกคลุมกิ่งหรือลำต้น สามารถลุกลามไปได้ เส้นใยจากสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีครีมถึงชมพูอ่อน เมื่ออากาศที่เชื้อราขึ้นปกคลุมจะพบเนื้อไม้แห้งเป็นสีน้ำตาล



การแพร่ระบาด

โรคราสีชมพูพบระบาดในฤดูฝน ซึ่งสภาพอากาศมีความชื้นสูง มักพบเกิดขึ้นกับต้นทุเรียนที่ขาดการดูแลรักษาที่ดี ไม่มีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสม ไม่มีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก โดยเชื้อราจะเข้าทำลายบริเวณกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่ม

การป้องกันกำจัด

1. ทำการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แต่งกิ่งที่เจริญซ้อนทับออก และทำการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกไม่ให้รบกวน
2. ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการเริ่มของโรคที่กิ่งให้หักหรือเดือนส่วนที่เชื้อราเจริญออกให้หมด ถ้าเชื้อราเจริญเข้าไปใต้เปลือกและลุกลามมากให้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกและนำไปทำลายนอกแปลง ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (copper oxychloride) 85% WP ไพรโคสโตรบิน 25% EC หรือ อะซอกซิสโตรบิน+ ไดฟโนโคนาโซล
3. หมั่นตรวจดูแปลงทุเรียนและพืชอาศัยของโรคที่ปลูกร่วมอยู่ในแปลงเป็นประจำ หากพบอาการเริ่มต้นให้รีบทำการกำจัด



039-511008 ต่อ 16



อารักขาพืชตราด



ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร



สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ประจำเดือน ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช พฤษภาคม

โรคเน่าคอดินในพริก

ลักษณะการทำลาย

โรคเน่าคอดินในพริกเกิดจากเชื้อราที่ทำลายต้นกล้า ทำให้ลำต้นเน่าและหักล้ม ส่งผลให้ต้นตายได้ อาการที่สังเกตได้คือ โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาลดำน้ำ มีอาการเหี่ยวเหลือง และใบร่วงในที่สุด

- ระยะแรก: ใบพริกจะเหี่ยวในช่วงกลางวัน แต่ตอนเย็นจะกลับมาตั้งตัวได้ใหม่
- ระยะปานกลาง: ใบเริ่มเหลือง ก้านใบจะลู่ลง ต้นดูอ่อนแอ และใบร่วงอย่างต่อเนื่อง
- ระยะรุนแรง: โคนต้นจะแสดงแผลสีน้ำตาล เมื่อถึงต้นขึ้นจะพบรากเปื่อยยุ่ยและมีกลิ่นเหม็น
- กับต้นกล้า: ต้นกล้าจะเน่าที่โคนต้นหักยุบลง ทำให้ต้นตายอย่างรวดเร็ว

การแพร่ระบาด

- เกิดจากเชื้อราในดิน โดยเฉพาะเชื้อรา *Pythium sp.* และ *Rhizoctonia solani*
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคคือ อากาศร้อน มีฝนตก หรือมีน้ำท่วมขังในดิน
- เชื้อโรคแพร่กระจายผ่านทางน้ำ ฝน ลม และเศษซากพืชที่เป็นโรค



การป้องกันกำจัด

1. ควรไถพรวนดินตากแดด เพื่อกำจัดเชื้อที่สะสมอยู่ในดินก่อนปลูก
2. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังราก
3. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้โคนต้นโปร่ง แดดส่องถึง ลดการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุ
4. หากพบต้นเป็นโรค ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณนั้นทำลายทิ้งนอกแปลง
5. กำจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลง เพื่อป้องกันการสะสมเชื้อโรค



039-511008 ต่อ 16



อารักขาพืชตราด



ที่มา : สำนักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร